

Begriptoets

Stap 1) Knip de onderstaande picto's uit en leg ze op tafel. Doe dat in volgorde 3, 1, 2 zoals hieronder weergegeven. Let op: knip de cijfers (en de woorden) niet mee uit!

Stap 2) Stel de begriptoetsvraag aan de cliënt en laat in de goede volgorde leggen:

"Kan je deze gezichten in een goede rij neerleggen van geen pijn hier" (wijs naar plek op de tafel linksboven van cliënt) "tot heel veel pijn hier (wijs naar plek op de tafel rechtsboven van cliënt)?" (begrip = **goede** volgorde). Probeer niet te helpen: indien echt nodig, kunnen hooguit de volgende vragen gesteld worden: "Welk gezichtje heeft geen pijn?" (leg linksboven van cliënt), "Welk gezichtje heeft heel veel pijn?" (leg rechtsboven van cliënt) en "Waar moet dit gezichtje? Hoeveel pijn heeft dit gezichtje?" (leg neer afhankelijk van antwoord cliënt). "Ligt het zo goed?"



3



1



2

Pijnbeleving uitvragen (alleen indien begriptoets is behaald)

Stap 1) Leg de picto's in de goede volgorde (zoals hieronder) zonder de woorden eronder te noemen.

Stap 2) Stel de pijnbelevingsvraag aan de cliënt en laat de cliënt aanwijzen:

"Welk gezichtje past het beste bij hoe jouw pijn van binnen voelt?"



Geen pijn



Beetje pijn



Veel pijn

Bron pictogrammen: www.sclera.be

Let op: de begriptoets is alleen een schatting van het theoretisch begrip van de schaalwaarden en geen garantie dat de cliënt op de eigen pijnbeleving kan reflecteren om vervolgens het de passende schaalwaarde te kiezen.

Vermijd gesloten, sturende vragen en stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk zelf te antwoorden.